

Перечень обследований, необходимых для проведения вмешательств в условиях внутривенной общей анестезии.

I Анализы (сроком не более 10 дней на момент проведения седации/анестезии)

- Общий анализ крови (лейкоциты, эритроциты, гемоглобин, тромбоциты, лейкоцитарная формула), общий анализ мочи.
- Биохимический анализ крови: общий белок, общий билирубин, глюкоза, АЛТ, АСТ, мочевины, креатинин, электролиты (Na, K, Cl, Ca).
- Коагулограмма (АЧТВ, ТВ, ПТВ, МНО, фибриноген).
- Группа крови и резус фактор (оригинал, заверенный с печатью и подписью врача, выполнившего исследование); кровь на ВИЧ и сифилис.

II Обследования

- ЭКГ для пациентов 40 лет и старше (сроком не более 30 дней до проведения седации/анестезии, с заключением).
- При наличии отклонений от нормы на ЭКГ - предоставить для сравнения в динамике ЭКГ-исследования более ранних сроков, консультация кардиолога).

III ** Дополнительно

- При наличии в анамнезе острой кардиологической и/или неврологической патологии в течение последнего года – консультация кардиолога и/или невролога.
- При наличии инсулинозависимого сахарного диабета – консультация эндокринолога для коррекции инсулинотерапии в периоперационный период (до, во время, после исследования).
- При наличии других хронических заболеваний внутренних органов в стадии частичной компенсации – выписка из амбулаторной карты (с заключением участкового терапевта / врача общей практики).
- При приеме не прямых антикоагулянтов (варфарин), новых оральных антикоагулянтов (ксарелто, прадакса), антиагрегантов (клопидогрель, тикагрелор) – консультация кардиолога/терапевта для коррекции терапии в периоперационный период.
- Консультация анестезиолога – желательна явка не менее чем за сутки до исследования с целью определения тактики и полноты подготовки перед исследованием и снижения риска осложнений (согласование времени консультации по телефону).

IV Категорически запрещено:

- прием пищи в день исследования;
- прием жидкости менее чем за 3 часа до седации/анестезии;
- в связи с остаточным влиянием применяемых лекарственных средств, применяемых для проведения анестезии, после проведения исследования в течении 24 часов управлять автотранспортом/опасными механизмами, заниматься потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных способностей (замедляется скорость психомоторных реакций).

При невыполнении данных условий и отсутствии необходимых данных для оценки состояния здоровья в проведении седации / общей анестезии может быть отказано в соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Беларусь.

Тел. для справок: +375 (29) 331-05-05